

SCUOLA DI OMEOPATIA SISDOH



«UN CASO DI RGE NEL NEONATO»

Dott.ssa Monica Greco

CASO CLINICO

Niccolo'

6 mesi

10 LUGLIO 2014

MOTIVO DELLA VISITA



IMG_1491.MOV

Stipsi + RGE fin dal 4° mese di vita
Adesso con pianto e urla inconsolabili
Spiccato nervosismo



BISOGNA CAMBIARE PROSPETTIVA



**NON SI TRATTA DI LOTTARE CONTRO IL REFLUSSO,
POI CONTRO LA STIPSI E POI ANCORA CONTRO IL
NERVOSISMO**

**MA DI LAVORARE ALLA RADICE DEL PROBLEMA
DOVE I 3 SINTOMI HANNO UNA UNICA CAUSA:
MIGLIORARE LA ALIMENTAZIONE DI MAMMA E
BAMBINO E LAVORANDO SULLA PARASSITOSI**

STIPSI, NERVOSISMO, RGE = ALIMENTI DA EVITARE ANCHE NELLA MAMMA



ALIMENTI DA EVITARE IN CASO DI PARASSITOSI INTESTINALE

- ◆ Latte vaccino (sostituire con latte di capra, di soia, di riso o di mandorla)
- ◆ Formaggi derivati dal latte vaccino (sostituire con quelli di capra, di pecora o di soia)
- ◆ Alimenti che contengono latte vaccino (yogurt, ricotta, dolci, creme, gelati, panna, ecc.)
- ◆ Cioccolato sia al latte che fondente
- ◆ Alimenti che contengono farina di grano (è concessa la farina di farro, di kamut, di ceci, la pasta di riso o di mais)
- ◆ Pizza e focacce
- ◆ Carni rosse e di maiale (sostituire con carni bianche e pesce)
- ◆ Insaccati (salame, prosciutto cotto, mortadella, wurstel, lardo). Sono concessi il prosciutto crudo e la bresaola
- ◆ Crostacei, frutti di mare (cozze, vongole, ostriche), frittiture di pesce
- ◆ Banana, uva, ananas, cachi, cocco
- ◆ Frutta secca (noci, nocciole, arachidi, pistacchi)
- ◆ Vino, birra, alcolici
- ◆ Caffè (anche decaffeinato), tè, camomilla

**+ : ARANCE, MANDARINI, POMPELMO, ACETO
POMODORO, MENTA, MIELE, PICCANTE**

EREDITA'

RAMO PATERNO:

PADRE: ECTO, AFTE RICORRENTI

NONNA : IMA, INSONNIA

NONNO: MAGRISSIMO, EMORROIDI

PARASSITOSI

1° LIVELLO :
COLICHE ADDOMINALI
STIPSI
REFLUSSO



PRINCIPALI MANIFESTAZIONI CLINICHE DELLA PARASSITOSI INTESTINALE (in ordine crescente di gravità)

- ♦ Ittero neonatale
- ♦ Lingua patinata
- ♦ Coliche addominali
- ♦ Occhi cerchiati
- ♦ Stitichezza
- ♦ Convulsioni febbrili
- ♦ Reflusso gastroesofageo
- ♦ Prurito in gola con tosse secca
- ♦ Alitosi
- ♦ Agitazione, insonnia
- ♦ Dermatite atopica
- ♦ Acetone
- ♦ Catarro delle mucose respiratorie
- ♦ Accessi di tosse abbaiante, laringospasmo
- ♦ Bruxismo
- ♦ Prurito anale
- ♦ Micosi cutanee, Candida genitale
- ♦ Allergie di ogni tipo
- ♦ Orticaria
- ♦ Gastrite
- ♦ Colite
- ♦ Cefalea
- ♦ Celiachia
- ♦ Emorroidi
- ♦ Afte
- ♦ Ossiuri
- ♦ Colon irritabile
- ♦ Ulcera gastroduodenale
- ♦ Diabete giovanile
- ♦ Rettocolite ulcerosa
- ♦ Psoriasi
- ♦ Alopecia
- ♦ Artrite reumatoide
- ♦ Sclerosi multipla
- ♦ Morbo di Crohn
- ♦ Lupus eritematoso sistemico (LES)
- ♦ Tumore del colon

N.B. Dal momento che tutte queste manifestazioni sono espressione dei processi naturali di eliminazione delle tossine intestinali dovute alla parassitosi, qualunque trattamento rivolto unicamente alla soppressione dei sintomi provoca sempre un aggravamento dello stato di parassitosi dell'intestino.

Così facendo si determina la progressione verso patologie sempre più interne e quindi più gravi.

In particolare, bisogna assolutamente evitare l'assunzione dei seguenti farmaci:

- ♦ Antibiotici
- ♦ Antiacidi (tipo Riopan, Antra, Pariet, ecc.)
- ♦ Cortisone
- ♦ Antimicotici
- ♦ Antistaminici
- ♦ Antivomito (tipo Biochetasi, Plasil, ecc.)
- ♦ Antiulcera (tipo Ranidil, Zantac, ecc.)
- ♦ Antiparassiti (tipo Vermox)
- ♦ Lassativi
- ♦ Mucolitici
- ♦ Anticonvulsivi (tipo Valium)
- ♦ Pomate antiemorroidi (tipo Preparazione H)
- ♦ Tranquillanti (tipo Noprom)
- ♦ Broncodilatatori (tipo Breva, Ventolin)
- ♦ Interferone
- ♦ Vaccini di ogni tipo

VACCINAZIONI

NESSUNA !!!



DATI ANAMNESTICI

- *A 1 mese COLICHE sempre alle 4.00-5.00 e RGE (l'osteopata ha tolto latticini) con pianto, si contorceva tirando le gambine sulla pancia, con pancia molto gonfia. Dopo 1/2 ora si calmava*
- *Dai 3 mesi frequenti rigurgiti e vomiti a getto; a 4 mesi diagnosi di RGE con rigurgito a getto e vomito paragonabile a ricotta (GASTROTUSS)*
- *DERMATITE cuoio capelluto (> DOPO sosp dei LATTICINI)*



Carattere

Irritabile

Arrabbiato

Piangeva in maniera ininterrotta frequentemente dopo la poppata.

La nonna lo definiva come un gemito da spasmo...

Spesso si svegliava con pianto inconsolabile che migliorava per poco con la poppata



Terapia PREVISTA in questo caso
sulla parassitosi

1 ° riscontro via mail dopo 4 gg



14 luglio 2014

Gentilissima Monica,

Ti scrivo per aggiornarti su Niccolò.

Dal giorno della tua visita, giovedì scorso, ho iniziato a dargli la terapia. Oggi, che è il quarto giorno di terapia, sembra molto più tranquillo e gli episodi di pianto incontrollato si sono ridotti molto (oggi e ieri non ne ha avuti). L' intestino è tornato regolare

2 ° riscontro via mail dopo 4 gg



22 luglio 2014

Scusami, volevo solo precisarti che il rigurgito acido con ricottina c'è ancora (soprattutto dopo il mio latte), ma non è più accompagnato da episodi di pianto.

Grazie ancora! buon lavoro!

3 ° riscontro via mail dopo 4 gg



09 Settembre 2014

Ti aggiorno su come stiamo procedendo: Niccolò e' da circa due mesi che sta facendo la terapia del terreno.

Il reflusso è molto migliorato,

non ha più avuto episodi di pianto come avevi visto purtroppo tu.

il rigurgito e' presente ancora in alcuni momenti.

Il suo intestino da venti giorni e' diventato un orologio svizzero e va di corpo una volta al giorno senza sgarrare.

Da qualche settimana abbiamo notato nascere alcuni dentini !

Quando ripenso a come siamo partiti quando sono venuta da te la prima volta non posso credere che la situazione sia cambiata così radicalmente. Risultati grandiosi.

Visita di controllo: 2 dicembre 14

In cosa è migliorato

«...Ad oggi Niccolo, a distanza di 5 mesi, tra cura del terreno ed alimentazione differente da prima, ha fatto notevoli miglioramenti a livello di:

- *RGE (risolto)*
- *Stipsi (risolta)*
- *Irritabilità (ora è*



IMG_3484.MOV



IMG_3491.MOV



Carattere

Socievole

Solare

Tranquillo

Pacifico





